

que no penetraba en el canal endocervical. Se le tomó una biopsia cuya anatomía patológica informó: SIL de bajo grado-HPV.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado en esta paciente?

- a) Conducta expectante
- b) Procedimiento de electrofulguración
- c) Conización cervical
- d) Histerectomía total

96) Una paciente que cursa un embarazo de 35 semanas consulta por presentar dolor y hemorragia vaginales. En el examen obstétrico se constata hemorragia vaginal profusa, dolor a la palpación uterina, hipertonia uterina y una frecuencia cardíaca fetal basal de 80 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Rotura de vasa previa
- b) Desgarro cervical uterino
- c) Rotura uterina
- d) Desprendimiento placentario

97) Una paciente de 60 años presenta un nódulo palpable de 2 x 1 cm en el cuadrante súpero externo de la mama derecha. Trae una mamografía cuyo informe es: nódulo de bordes irregulares con retracción del parénquima circundante, BI-RADS V. ¿Cuál es la conducta más adecuada ante este caso?

- a) Control mamográfico en 6 meses
- b) Biopsia radioquirúrgica
- c) Tumorectomía y biopsia por congelación
- d) Mastectomía radical modificada

98) Un paciente de 50 años consulta por presentar problemas con el alcohol. Ha llegado a establecer con su médico un acuerdo con respecto a su problema con la bebida y acepta un plan de tratamiento. ¿En qué fase de la conducta adictiva se encuentra este paciente?

- a) Precontemplación
- b) Contemplación
- c) Preparación
- d) Acción

99) Un paciente de 70 años, jubilado, con pareja estable, residente en la ciudad Buenos Aires y sin antecedentes clínicos de importancia lo consulta para un examen periódico de salud. Dentro de sus recomendaciones, ¿qué vacunas debe indicarle a este paciente?

- a) Antigripal, una dosis anual durante el otoño; antineumocócica, una dosis; doble bacteriana (dT), una dosis cada 10 años
- b) Antigripal, una dosis anual durante el invierno; antihepatitis A, dos dosis en un año; doble bacteriana (dT), una dosis cada 10 años
- c) Antigripal, una dosis anual durante el otoño; antineumocócica, dos dosis con intervalo de tres años; doble bacteriana (dT), una dosis cada 10 años
- d) Antigripal, una dosis anual durante el otoño; antihepatitis B, tres dosis en un año; antineumocócica, una dosis; doble bacteriana (dT), una dosis cada 10 años

100) Lo consulta una enfermera de 24 años, recién matriculada, que va ingresar a trabajar en un hospital general de agudos. En su carnet de vacunación constan todas las vacunas

recomendadas hasta los 16 años. Tuvo hepatitis A y varicela durante la infancia y recibió tres dosis de vacuna contra la hepatitis B durante sus estudios. ¿Qué vacunas debe indicarle a esta paciente?

- a) Antigripal, una dosis anual durante el otoño; antineumocócica, una dosis; doble bacteriana (dT) cuando cumpla 26 años; triple viral
- b) Antigripal, una dosis anual durante el otoño; doble bacteriana (dT) cuando cumpla 26 años y luego una dosis cada 10 años
- c) Antigripal, una dosis anual durante el otoño; BCG, una dosis; doble bacteriana (dT), una dosis cada 10 años
- d) Antigripal, una dosis anual durante el otoño; refuerzo de doble bacteriana (dT) y luego una dosis cada 10 años; antineumocócica, una dosis

Respuestas

- 1. D
- 2. B
- 3. B
- 4. B
- 5. B
- 6. B
- 7. D
- 8. C
- 9. A
- 10. C
- 11. A
- 12. A
- 13. D
- 14. B
- 15. A
- 16. B
- 17. C
- 18. C
- 19. A
- 20. A
- 21. B
- 22. B
- 23. A
- 24. D
- 25. C
- 26. B
- 27. A
- 28. C
- 29. C
- 30. D
- 31. A
- 32. B

33.D
34.D
35.C
36.C
37.C
38.B
39.A
40.B
41.D
42.B
43.A
44.A
45.C
46.B
47.C
48.D
49.D
50.B
51.C
52.B
53.C
54.A
55.B
56.D
57.A
58.B
59.A
60.D
61.D
62.C
63.A
64.C
65.C
66.B
67.D
68.B
69.B
70.A
71.D
72.C
73.A
74.D
75.A
76.D
77.D
78.B
79.C
80.B



81.D
82.C
83.A
84.B
85.A
86.B
87.D
88.C
89.C
90.A
91.D
92.A
93.B
94.B
95.B
96.D
97.C
98.C
99.A
100.B



