

88) ¿Cuál es el factor predictivo más importante de mala calidad de vida en los pacientes con trastornos mentales graves?

- a) Necesidades básicas insatisfechas
- b) Inaccesibilidad al sistema de salud
- c) Situación conflictiva del entorno familiar
- d) Inaccesibilidad a la asistencia psiquiátrica

89) Según el documento "Indicadores Básicos Argentina 2008", ¿cuál es la provincia que presenta los porcentajes más bajos de población total con agua corriente (57.2%) y de población total con desagües cloacales (11.3%)?

- a) Tierra del Fuego
- b) Jujuy
- c) Misiones
- d) Salta

90) Según el documento "Indicadores Básicos Argentina 2008, ¿cuál es la Región que presenta las más altas Tasas Brutas de Mortalidad?

- a) Noroeste (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán)
- b) Cuyo (La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis)
- c) Patagónica (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego)
- d) Noreste (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones)

91) Según el documento "Indicadores Básicos Argentina 2008", uno de los indicadores de salud para el monitoreo de las metas del milenio es la tasa de prevalencia de uso de preservativos entre los jóvenes de 15 a 24 años. Dentro del período del año 2003 al 2005, según los datos disponibles ¿Qué sucedió con esta tasa?

- a) Aumentó
- b) Permaneció estable
- c) Disminuyó
- d) Tiene valores heterogéneos sin direccionalidad

92) ¿Cuál es la razón fundamental por la cual ante una dolencia, algunas personas consultan a la curandera?

- a) Por ignorancia de los conocimientos científicos en que se basa la atención en salud
- b) Porque definen el concepto de salud- enfermedad en relación con los valores de su propia cultura
- c) Porque el sistema tradicional de salud no da respuesta a algunas dolencias
- d) Porque algunas dolencias sólo pueden resolverse a través de esta intervención

93) ¿Cuál es la inmunodeficiencia primaria más común en pediatría?

- a) Déficit de IgA
- b) Déficit de subclases de IgG
- c) Síndrome de Wiskott Aldrich
- d) Agranulocitosis ligada al X

94) Un niño de 8 meses presenta hematomas superficiales y hemartrosis desde que ha comenzado a gatear, ¿cuál de las siguientes pruebas de laboratorio estará alterada o prolongada?

- a) KPTT
- b) Tiempo de protrombina
- c) Tiempo de trombina
- d) Tiempo de coagulación

95) Un paciente de 19 años ingresa a la sala de emergencias, acompañado de sus padres, y refiere haber ingerido alcohol en un local bailable varias horas antes pero no recuerda si usó alguna otra sustancia. En el examen físico presenta euforia, inquietud y agitación acompañada de alucinaciones, TA: 125/80 mmHg, taquicardia y midriasis. ¿Qué sustancia probablemente haya ingerido?

- a) Clonazepam
- b) Éxtasis
- c) Gamahidroxitirato
- d) Popper

96) Un paciente de 28 años presenta ginecomastia sin otros signos físicos de interés. Como antecedente de importancia el paciente refiere consumo de sustancias de abuso. Luego de solicitar laboratorio específico encuentra niveles de testosterona disminuidos y presencia de espermatozoides anormales con disminución de la motilidad en el espermograma. ¿Qué droga de abuso puede producir este cuadro?

- a) Cocaína
- b) Éxtasis
- c) Opiáceos
- d) Marihuana

97) Un niño de 2 años es traído a la consulta en guardia porque ingirió en forma accidental, hace aproximadamente 6 horas, una pila tipo botón. Se le realiza radiografía de tórax y abdomen y se visualiza la pila en esófago, ¿cuál es la conducta más adecuada?

- a) Provocar el vómito
- b) Internación y repetir radiografía
- c) Extracción urgente por endoscopia
- d) Esperar eliminación por materia fecal

98) Un paciente de 48 años consulta a la guardia por presentar irritación ocular, parestesias, vómitos y mareos. Refiere haber dormido la noche anterior en una habitación que había sido fumigada previamente. ¿A qué sustancia estuvo expuesto?

- a) Compuestos órgano fosforados
- b) Piretroides
- c) Carbamatos
- d) Compuestos bupiridilos

99) Un paciente de 16 años de edad es traído por la ambulancia desde su domicilio por intento de suicidio. Según refiere el médico que lo asiste inicialmente, el paciente fue hallado con deterioro

del sensorio, en una habitación de 10 metros cuadrados, sin ventilación y con las hornallas de la cocina abiertas, liberando gas. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Control clínico evolutivo
- b) Indicar tratamiento con cámara hiperbárica
- c) Administrar oxigenoterapia
- d) Administración inhalatoria de nitrito de amilo


100) ¿Cómo se realiza el diagnóstico de nefropatía temprana en un paciente diabético tipo II asintomático?

- a) Proteinuria en muestra aislada de orina
- b) Dos microalbuminurias en orina de 24 horas
- c) Proteinuria cuantificada en orina de 24 horas
- d) Relación microalbuminuria/creatininuria en orina de 24 horas

Respuestas

- 1. C
- 2. A
- 3. D
- 4. A
- 5. B
- 6. D
- 7. C
- 8. B
- 9. B
- 10. B
- 11. C
- 12. A
- 13. D
- 14. C
- 15. D
- 16. B
- 17. A
- 18. D
- 19. A
- 20. C
- 21. D
- 22. C
- 23. A
- 24. D
- 25. D
- 26. D
- 27. D
- 28. A
- 29. C
- 30. D
- 31. A
- 32. C

- 33. B
- 34. D
- 35. C
- 36. B
- 37. A
- 38. D
- 39. C
- 40. B
- 41. D
- 42. C
- 43. C
- 44. A
- 45. A
- 46. A
- 47. A
- 48. A
- 49. C
- 50. A
- 51. A
- 52. B
- 53. A
- 54. B
- 55. A
- 56. D
- 57. D
- 58. C
- 59. D
- 60. D
- 61. C
- 62. D
- 63. D
- 64. A
- 65. C
- 66. B
- 67. A
- 68. C
- 69. C
- 70. D
- 71. A
- 72. A
- 73. D
- 74. C
- 75. A
- 76. B
- 77. C
- 78. A
- 79. D
- 80. D
- 81. B
- 82. D
- 83. D
- 84. B



- 85. D
- 86. B
- 87. A
- 88. A
- 89. C
- 90. D
- 91. C
- 92. B
- 93. A
- 94. A
- 95. B
- 96. D
- 97. A
- 98. B
- 99. C
- 100. B

