

- c) Entregar un dispositivo intrauterino a la madre para que se lo haga colocar a su hija en un centro privado
- d) Solicitar a las autoridades de la Escuela a la que concurre Ana, una entrevista para asesorarla allí

86) La incontinencia de orina al esfuerzo de primer grado se caracteriza por:

- a) La pérdida de orina se produce durante los esfuerzos estando la paciente de pie
- b) La pérdida de orina se produce cuando la paciente en decúbito realiza un esfuerzo
- c) La pérdida de orina se produce con mínimos esfuerzos
- d) La paciente no logra llegar al baño ante el deseo miccional

87) Una paciente de 40 años presenta una lesión cervical intraepitelial de alto grado (SIL de alto grado) diagnosticada por biopsia exocervical con legrado endocervical positivo y no desea tener más hijos. ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a este caso?

- a) Anexohisterectomía
- b) Histerectomía total
- c) Conización
- d) Colpoanexohisterectomía

88) Una paciente de 56 años presenta un carcinoma infiltrante ubicado en el cuadrante externo de la mama izquierda, cuya clasificación es T1 N0 M0. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico indicado?

- a) Mastectomía radical convencional
- b) Mastectomía simple
- c) Tumorectomía con margen de seguridad y vaciamiento axilar
- d) Mastectomía radical modificada tipo Madden

89) Una paciente de 30 años, embarazada de 12 semanas consulta por metrorragia. En el examen genital presenta una desproporción entre el tiempo de amenorrea y el tamaño uterino y de ambos ovarios, que se encuentran aumentados de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Gestación en útero miomatoso y blastoma de ovario
- b) Gestación gemelar y cuerpo amarillo de la gestación
- c) Gestación molar
- d) Gestación ectópica

90) La alteración del ciclo bifásico conocida como polimenorrea se define como:

- a) Pérdida sanguínea excesiva durante la menstruación
- b) Acortamiento del intervalo menstrual inferior a los 21 días
- c) Menstruaciones dolorosas por alteración en la contractilidad uterina
- d) Menstruaciones que se prolongan por más de 7 días

91) Una paciente en el tercer trimestre del embarazo se presenta al control prenatal. Tiene una serología positiva para HIV recientemente detectada. No ha realizado tratamiento antiretroviral en el embarazo y no se cuenta con recuento de linfocitos CD4 ni de carga viral. ¿Cuál es la conducta más adecuada en esta paciente?

- a) Comenzar la administración de tratamiento antiretroviral, programar una operación cesárea para alrededor de las 38 semanas y la administración de zidovudina intravenosa durante la cesárea
- b) Considerar el tratamiento definitivo de la paciente de acuerdo a los datos del nivel de linfocitos y de la carga viral
- c) Esperar el trabajo de parto y administrar zidovudina intravenosa durante el mismo
- d) Programar una operación cesárea para alrededor de las 38 semanas y administrar zidovudina durante 6 meses al recién nacido

92) Una paciente de 17 años, primigesta, se encuentra cursando un embarazo de 36 semanas. Consulta por cefalea, náuseas y dolor en el epigastrio de 24 horas de evolución. La acompaña su madre quien refiere haber notado un cambio de conducta en los últimos días, caracterizado por irritabilidad, conducta agresiva con sus hermanos pequeños y ansiedad. En

- el examen físico se constata una tensión arterial de 160/110 mmHg, una altura uterina de 32 cm, presentación cefálica, latidos fetales positivos; el cuello uterino se encuentra orientado hacia la pared posterior de la vagina, reblandecido, ligeramente acortado y cerrado. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo y la conducta más adecuada?
- Hemorragia cerebral y solicitud de una tomografía axial computada de cerebro
 - Feocromocitoma y determinación de ácido vainillín-mandélico
 - Hipertensión arterial inducida por el embarazo e inducción del parto a las 41 semanas
 - Hipertensión gestacional más preeclampsia, solicitud de proteinuria, hemograma con plaquetas, hepatograma y coagulograma y finalización del embarazo
- 93) En una paciente que presenta microcalcificaciones en la mama derecha, clasificadas como Grado IV según la Sociedad Americana de Radiología, ¿Cuál es la conducta más adecuada?
- Conducta expectante con nueva evaluación cada 6 meses
 - Adenomamectomía
 - Biopsia radioquirúrgica o percutánea con histología
 - Punción con aguja fina para estudio citológico
- 94) Una paciente de 23 años consulta por dolor pelviano, flujo genital y fiebre. Tiene colocado un dispositivo intrauterino (DIU) como método anticonceptivo. Presenta 38 °C de temperatura axilar y en el examen ginecológico se tacta el útero y el anexo derechos dolorosos. ¿Cuál es la conducta más adecuada en esta paciente?
- Extracción del DIU, indicación de óvulos y control en 48 horas
 - Toma de cultivo endocervical, extracción del DIU, indicación de una monodosis de cefalosporina de 3ra. generación más doxiciclina por 10 días y control en 48 horas
 - Toma de cultivo endocervical y hemocultivos e indicación de tratamiento antibiótico de acuerdo al resultado de los cultivos
 - Toma de cultivo endocervical, extracción del DIU, indicación de analgésicos y antiinflamatorios no esteroides y control en 48 horas
- 95) Una paciente de 64 años tiene el antecedente de un cáncer de ovario por el que fue intervenida quirúrgicamente y recibió quimioterapia. En una resonancia magnética de control se observa un tumor único en la pelvis. ¿Cuál sería el criterio para reintervenirla quirúrgicamente?
- Laparotomía de revisión (second look)
 - Cirugía citorreductiva secundaria (second effort)
 - Estadificación quirúrgica
 - Evaluar cambios en la histología tumoral
- 96) A una paciente de 45 años, menopáusica, se le realiza una conización cuyo informe histológico es: cáncer epidermoide con invasión estromal de 3,5 mm de profundidad y 7 mm de extensión superficial. ¿Cuál es la estadificación según la FIGO (1994) y la conducta terapéutica más adecuada?
- Estadio Ia1 y reconización
 - Estadio Ia2 e hysterectomía total
 - Estadio Ia1 y operación de Wertheim Meigs
 - Estadio Ia2 y colpohysterectomía total ampliada con linfadenectomía pelviana bilateral
- 97) Durante el trabajo de parto de un embarazo gemelar a término, el primer feto se encuentra en situación transversa y el segundo en cefálica. ¿Cuál sería la conducta más adecuada frente a este caso?
- Cesárea abdominal
 - Rotación externa y parto vaginal
 - Parto vaginal
 - Versión externa y gran extracción pelviana
- 98) El tratamiento adecuado para la toxoplasmosis aguda en el embarazo debe incluir:
- Amoxicilina, corticoides y ácido fólico
 - Pyrimetamina, sulfadiazina, espiramicina y ácido fólico
 - Trimetoprima-sulfametoxazol y ácido fólico

d) Clindamicina y estreptomomicina

99) Una mujer de 30 años en el segundo trimestre de su embarazo, realiza el primer control obstétrico. Tiene como antecedentes un parto eutócico hace un año; vivió hasta hace tres meses en el Norte argentino y tiene serología positiva para Chagas. Trae a la consulta un hemograma reciente con una hemoglobina de 10 g/dl, un hematocrito de 30% y recuento de glóbulos blancos y plaquetas normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a esta paciente?

- a) Suplemento de ácido fólico y hierro; tratamiento antihelmíntico; solicitud de ECG y programación de los próximos controles
- b) Suplemento de ácido fólico y hierro; programación del tratamiento antihelmíntico y antichagásico para el tercer trimestre
- c) Suplemento de ácido fólico y solicitud de parasitológico de materia fecal
- d) Solicitud de nuevo hemograma y ECG; tratamiento antihelmíntico y antichagásico

100) Una paciente con nueve semanas de amenorrea presenta dolor cólico en el hipogastrio y una metrorragia profusa y persistente de dos días de evolución. En el examen ginecológico presenta un útero blando, aumentado de tamaño y el cuello uterino dilatado en sus dos orificios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Amenaza de aborto
- b) Aborto completo
- c) Muerte embrionaria precoz
- d) Aborto incompleto

Respuestas

- 1. B
- 2. D
- 3. B
- 4. D
- 5. D
- 6. A
- 7. A
- 8. B
- 9. C
- 10. B
- 11. A
- 12. C
- 13. D
- 14. A
- 15. A
- 16. B
- 17. C
- 18. C
- 19. B
- 20. A
- 21. B
- 22. B
- 23. D
- 24. A
- 25. A
- 26. C
- 27. B
- 28. D
- 29. D
- 30. B

31. A
32. A
33. D
34. C
35. C
36. B
37. A
38. B
39. B
40. C
41. A
42. B
43. D
44. C
45. B
46. C
47. D
48. A
49. B
50. C
51. A
52. B
53. C
54. D
55. A
56. D
57. C
58. A
59. C
60. D
61. B
62. D
63. A
64. A
65. C
66. D
67. B
68. C
69. C
70. B
71. C
72. ANULADA
73. B
74. C
75. D
76. D
77. A
78. A
79. A
80. B
81. C
82. B
83. C
84. C
85. B
86. A
87. C
88. C
89. C



- 90. B
- 91. A
- 92. D
- 93. C
- 94. B
- 95. B
- 96. D
- 97. A
- 98. B
- 99. A
- 100. D

